

AVISOS AGRÍCOLAS
ESTAÇÃO DE AVISOS DE ENTRE DOURO E MINHO

CONTEÚDO ▼

VINHA – MÍLDIO,
OÍDIO, BLACK ROT,
TRAÇA-DA-UVA,
CIGARRINHA
VERDE,
CECIDÓMIAS

POMÓIDEAS-
PEDRADO,
BICHADO, OÍDIO

BATATEIRA –
TRAÇA DA BATATA

HORTÍCOLAS –
MÍLDIO NO
TOMATEIRO,

ORNAMENTAIS
TRAÇA DO BUXO

Pesquisa e conceção:
Carlos Gonçalves Bastos
(Eng.º Agrícola)
Carlos Coutinho
(Agente Técnico Agrícola)

**Monitorização de pragas,
doenças e desenvolvimento
das culturas:**
Carlos Bastos
C. Coutinho
Licínio Monteiro
(Assistente técnico)

**Produtos fitofarmacêuticos,
compilação e tratamento de
dados meteorológicos**
Carlos Bastos

Fotografia: Eng.º Carlos
Gonçalves Bastos, C.
Coutinho

APOIO:

**Informática/ Rede
Meteorológica:**
António Seabra Rocha
(Eng.º Agrícola)

**Fertilidade e conservação do
solo:**
Maria Manuela Costa
(Eng.ª Agrónoma)

VINHA

MÍLDIO

Plasmopara vitícola

Nas várias parcelas de vinha visitadas nas nossas últimas saídas de campo, foi possível constatar que já se encontravam no fim da floração e mesmo na fase de enchimento do bago.

Na maioria das parcelas, a presença de sintomatologia de míldio era residual ou de baixa incidência, fruto dos tratamentos regulares e bem posicionados. Embora se tenha verificado também, ataques de míldio com destruição quase total da produção em algumas parcelas.

Os aguaceiros previstos a partir do dia 10 de junho, poderão proporcionar condições de ocorrência de infeções secundárias nas parcelas de vinha onde o míldio se manifesta com presença de esporulações, quer nas folhas, quer nos cachos recém formados, quer mesmo nos lançamentos.

A previsão meteorológica para os próximos dias, aponta ainda para algumas localidades (muito poucas), para ocorrência de precipitações **acima dos 10 mm nos dias 10 e 11 de junho** ([consulte aqui a previsão para a sua localidade](#)), que pode levar ainda, ao desenvolvimento de infeções primárias e posteriormente a infeções secundárias de míldio. É apontado também para a queda de

Granizo, caso venha acontecer, consulte [aqui](#) as medidas a tomar.

As temperaturas elevadas que se estão a fazer senti, hoje 9 de junho, a rondar os 35/36 °C, poderão afetar a viabilidade dos esporos de míldio diretamente expostos aos raios solares, no entanto, nem todos poderão ser afetados, sobretudo os que estão protegidos, pelo que, esta situação aliada às condições meteorológicas previstas para os próximos dias, são favoráveis ao desenvolvimento do míldio.

Será de todo conveniente manter as parcelas de vinha protegidas dado a fase crítica de desenvolvimento do cacho.



Cacho da casta Alvarinho destruído pelo míldio
(observado a 2/06)

No combate ao míldio em **Modo de Produção Convencional** e em **Modo de Produção Biológico**, estão autorizados produtos indicados no **quadro anexo nº 1**.

PODRIDÃO NEGRA (BLACK ROT)

Guignardia bidwellii

Está a decorrer, ou ocorrerá muito brevemente o período de suscetibilidade do cacho ao Black rot, pois acontece entre o vingamento e o fecho do cacho, **sendo a suscetibilidade máxima do bago, quando são atingidos cerca de 175 Graus/Dia acumulados a partir de 80% da alimpa.**

Ocorrência de precipitações, seguidas temperaturas elevadas aumentam o risco de ataques de Black rot

Nas operações culturais (despampa, desfolha), procure retirar as folhas com pústulas de black rot, que são focos de propagação da doença.

Nos tratamentos ao míldio/oídio poderá utilizar um produto com ação simultânea contra o black rot

No combate ao black rot em vinhas no **Modo de Produção Biológico e Modo de Produção Convencional** são autorizados produtos indicados no **quadro anexo nº 2.**

OÍDIO

Erysiphe necator

Tempo enevoadado, quente e com luz difusa, são condições ótimas a ataques de oídio. Adicione à calda anti-míldio um produto contra o oídio, que pode ser **enxofre** ou utilize **fungicidas com ação múltipla**. Tenha atenção que acima dos 32°C poderá causar fitotoxicidade.

No combate ao oídio em vinhas no **Modo de Produção Biológico e modo de Produção Convencional** estão autorizados os produtos indicados no **quadro anexo 4**

TRAÇA-DA-UVA

Lobesia botrana

As capturas nas armadilhas com feromona têm sido baixas, estando quase no fim o 1º voo.

A estimativa do risco que temos feito nas vinhas visitadas resulta em valores muito abaixo do nível económico de ataque.

De modo geral, **consideramos desnecessário tratamento específico contra a traça deste voo/ geração.**

No entanto, antes de qualquer intervenção, proceda à estimativa do risco, **observando 100 cachos, 2 em cada videira em 50 videiras. Só se encontrar 100 a 200 ninhos de traça, será necessário efetuar um tratamento.**

Tenha em conta o tamanho e a compacidade dos cachos em cada casta.

CIGARRINHA VERDE

Empoasca vitis

Na monitorização desta praga, temos observado ninfas nas folhas, mas em níveis insignificantes (o máximo encontrado foi de 12 ninfas/100 folhas).

Esta percentagem de ocupação está muito abaixo do nível económico de ataque (NEA) adotado para o atual estado de desenvolvimento da Vinha- **50 a 100 ninfas/ 100 folhas** (observar a página inferior de 2 folhas bem desenvolvidas, do terço inferior da vara, por videira, em 50 videiras dispersas).

De acordo com o observado, considera-se não haver risco,deverá no entanto, antes de realizar qualquer tratamento, proceder à determinação do NEA nas suas parcelas.

Nas jovens vinhas com idade inferiores a quatro anos deverá ser efetuado um tratamento à presença da praga

CECIDÓMIA DAS FOLHAS DA VIDEIRA

(*Janetiella* (= *Dichelomyia*) *oenophila*)

Trata-se de um pequeno inseto, considerado como praga secundária que, na Região dos Vinhos Verdes, aparece esporadicamente e não tem importância económica.

As larvas deste inseto, ao desenvolverem-se sob a epiderme das folhas, provocam a formação das características galhas de forma esférica.

Não confundir os sintomas com os da erinose, nem com os da filoxera na fase galícola (galhas nas folhas), que aparece por vezes nas folhas de porta-enxertos e de produtores diretos.



Em cima sintomatologia provocada pela Cecidómia



Em baixo- (À esquerda) Ataque de Filoxera direita (Fase galícola (À direita) -Sintomatologia provocada pela Erinose

POMÓIDEAS

(MACIEIRA, PEREIRA, NESPEREIRA DO JAPÃO, NASHI, CODORNEIRO)

PEDRADO

Venturia inaequalis; *V. pyrina*

Mantenha o pomar protegido, sobretudo se for constituído por variedades sensíveis ou pouco tolerantes ao pedrado. A previsão meteorológica aponta para a queda de aguaceiros nos próximos dias

Recomenda-se o maior rigor no tratamento das plantas em viveiro e nos jovens pomares, que são mais vulneráveis.



Sintomas de pedrado em folha de macieira

No Modo de Produção Biológico, podem ser utilizadas, contra o pedrado, nesta fase, as substâncias referidas no Quadro 5.

OÍDIO DA MACIEIRA

Podosphaera leucotricha

Nos tratamentos contra o pedrado, utilize fungicidas de ação simultânea contra o oídio.

No Modo de Produção Biológico, podem ser utilizados produtos à base de enxofre contra o oídio da macieira (também recomendados contra o pedrado em Modo de Produção Biológico).

BICHADO

Cydia pomonella

As capturas nas nossas armadilhas têm sido nulas ou muito reduzidas. Em alguns locais, pode existir risco de ataques aos frutos, embora a previsão aponte para aguaceiros para os próximos dias.

Não faça tratamentos desnecessários. Proceda à estimativa do risco, para avaliar a necessidade do tratamento, de acordo com as regras da Proteção Integrada.

Observe 1000 frutos no pomar, 20 frutos por árvore, em 50 árvores ao acaso.

(NEA) O nível económico de ataque é de 0,5 a 1% de frutos atacados, o que representa 5 a 10 frutos atacados em 1000.

Em alternativa a esta contagem de frutos, se dispõe de armadilha com feromona para monitorização do voo no pomar, **o nível económico de ataque é 3 ou mais borboletas capturadas semanalmente**, contando ainda que as temperaturas do final do dia sejam superiores a 14 °C e a vegetação esteja seca.

Se usar os dois métodos em simultâneo, determinará com maior acerto a necessidade ou não de tratar e o momento de o fazer.

Para controlo do bichado no **Modo de Produção Biológico**, estão autorizados inseticidas à base de azadiractina, *Bacillus thuringiensis kurstaki* e vírus da granulose de *Cydia pomonella*.

TRAÇA DA BATATEIRA

Phtorimaea operculella

Medidas preventivas

Nas variedades temporãs, que se aproximam da colheita, se for detetada a presença da praga no batatal, deve realizar um tratamento, respeitando o intervalo de segurança. Inseticidas homologados à base das seguintes substâncias ativas

Modo de Produção Biológico

Bacillus thuringiensis várias subsp/estirpe. (**ação apenas na fase larvar, nos estádios iniciais de desenvolvimento**)

Modo de Produção convencional

Clorantraniliprol+lambda-cialotrina (**desde o desenvolvimento do caule principal até ao início da floração**)

Cipermetrina / Lambda-cialotrina/ deltametrina (Aplicar ao aparecimento da praga)

Clorantraniliprol

(Iniciar as aplicações no período de oviposição antes das primeiras eclosões. Desde o desenvolvimento da cultura até à senescência da folhagem)

Alguns fatores favorecem o ataque aos tubérculos no campo, pelo que devem ser tomadas algumas medidas preventivas.

► Logo que as batatas estejam prontas, devem ser colhidas. A duração da vegetação e a manutenção das batatas na terra por tempo desnecessário antes da colheita, favorece a traça.

► As batatas colhidas devem ser de imediato retiradas do campo e armazenadas. Nunca deixar as batatas no campo de um dia para o outro e muito menos cobertas com rama das batateiras.

No processo de armazenamento da batata:

► Limpar cuidadosamente os locais de armazenamento das batatas, retirando todos os restos que aí possam ter ficado da anterior colheita. Desinfetar armazéns e lojas, por exemplo, queimando enxofre, depois de ter calafetado bem todos os orifícios e fendas.

► As batatas atacadas de traça devem ser retiradas durante o armazenamento, de modo a não contaminarem as sãs.

► Em caso de suspeita de ataque de traça, as batatas podem ser polvilhadas, no armazém, com inseticidas em pó indicados para este fim.

► Desloque a armadilha da traça do campo para o armazém. Poderá, assim, detetar a eventual

presença de borboletas no interior e tomar as medidas adequadas.

► Em pequenos armazéns e lojas caseiras podem proteger-se as batatas da traça, cobrindo-as com uma camada espessa de pelo menos 2 cm de espessura de folhas ou rama seca de eucalipto, de Lantana ou de erva-príncipe. Estas plantas têm uma ação repulsiva da traça da batata



Sintomatologia do ataque da traça em armazém

HORTÍCOLAS

MÍLDIO NO TOMATEIRO

Phytophthora infestans

Dado que a previsão meteorológica aponta para aguaceiros nos próximos dias, mantenha a cultura protegida. O fungo que causa o míldio do tomateiro é o mesmo do míldio da batateira e possui elevada virulência e capacidade de destruição das plantas atacadas.



À esquerda-Tomates atacados pelo míldio, à direita – Caule de tomateiro afetado pelo míldio

ORNAMENTAIS

TRAÇA DO BUXO

Cydalima perspectalis

(Consulte aqui a circular nº 8)



Larva de traça do buxo (estádio final de desenvolvimento – L5 – tamanho próximo do natural)

MÍLDIO DO BUXO

Calonectria pseudonaviculata
(=*Cylindrocladium buxicola*)

(Consulte aqui a circular nº 7)



Sintomatologia do ataque do míldio do buxo

QUADRO 1-FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO MÍLDIO DA VIDEIRA EM 2025					
Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I. S	Modo de ação
ABE-IT 56 (lisado de Saccharomyces cerevisiae, estirpe DDSF623)	BELVINE (CER)	São necessárias no mínimo 2 aplicações consecutivas para ativar as defesas das plantas, com intervalos de 7 a 10 dias	SIM		A substância atua preventivamente estimulando as defesas naturais das plantas.
ametotradina (pirimidilamina) (QOSI)	ENERVIN SC (BASF)	Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural e mais de 2 tratamentos consecutivos	Não	35	Superfície –Adesão às ceras cuticulares/Preventivo
amisulbrome (sulfonamida) QIL	LEIMAY (NISSAN CHEMICAL)	Não fazer mais de 2 aplicações por ciclo cultural		28	Superfície/ possui algum efeito translaminar / essencialmente Preventivo, anti-esporulante
	ZONGRUUM (NISSAN CHEMICAL)				
azoxistrobina (estrobilurina) (Qoi)	AZAKA (FMC_ES)	Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural; ação simultânea Anti-Oídio; Black Rot e Escoriose		21	Penetrante com mobilidade translaminar e difusão lateral / atividade essencialmente preventiva, anti-esporulante, algum ação curativa.
	AZBANY® PRO- (NUFARM L)				
	QUADRIIS (SYNGENTA)				
	SINSTAR (AGROLAC)				
azoxistrobina +fosfanatos de potássio . (estrobilurina) (fosfanato) (Qoi)	SIVAR GOLD (LAINCO)	Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural		15	Penetrante. Sistêmico preventivo/Estimula a defesa natural das plantas
	DIRUNE (LAINCO)				
Cerevisana (paredes celulares da levedura Saccharomyces cerevisiae)	ROMEO (AGRAUXINE)	Atua preventivamente como indutor das defesas naturais das plantas Realizar no máximo 10 tratamentos por ano. Previne simultaneamente o oídio e a podridão cinzenta	SIM		Indutor da resistência das plantas/Preventivo
	EBUDIM (AGX)				
clazofamida (ciano-imidazol) (QIL)	BRIONFLO® 100 SC (EUROTSA)	Para evitar o desenvolvimento de resistências não efectuar mais que três tratamentos por ano com produtos do grupo Qil.	Não	21	Superfície/Penetrante mobilidade translaminar/ Preventivo, anti-esporulante
	CHANTICO (SELECTIS)				
	MANAMID® 100 SC (MANICA)				
	SALVOR® (EUROTSA)				
	DARAMUN® (DIACHEM)				
cimoxanil+cobre (oxicloreto) (acetamida + inorgânico)	CIMOFARM C (SAPEC)	Aplicarem em pós-floração , não aplicar mais de 4 kg/há/ano de cu		21	Penetrante translaminar/superfície/ Preventivo e curativo quando aplicado imediatamente a seguir às condições de infecção
	VITIPEC C (SAPEC)				
	CIMONIL C (SELECTIS)				
	CURAME 25 WG (MANICA)				
	VITIPEC C WG ADVANCE (ASCENZA)				
cimoxanil+cobre (hidróxido de cobre) (acetamida + inorgânico)	COPFORCE EXTRA (AGRIA)	Não são permitidas aplicações manuais, trator cabinado	28		
	CUPMAN (AGRIA)		28		
	PESMUS (AGRIA)		28		
cimoxanil+folpete (acetamida+ftalimida)	MILITE (SELECTIS)	Realizar no máximo 3 a 4 tratamentos. Apenas em uvas para vinificação	42*		
	MILITE WG (SELECTIS)				
	VITIPEC (ASCENZA)				
	VITIPEC WG ADVANCE (ASCENZA)				
	TWINGO (BCP)	uvas para vinificação, apenas 1 tratamento			
cimoxanil+folpete+ fosetil- alumínio (acetamida+ftalimida +organometálico)	ADARA TRIPLE (ADAMA)	Realizar no máximo 3 a 4 tratamentos. Com estes ou outros produtos com cimoxanil ** Em uvas de mesa, tratamentos apenas até floração Para trabalhos superiores a duas horas , reentrada na parcela apenas 28 dias após a aplicação Consulte o rótulo do produto a utilizar	28*/70**	Penetrante/Superfície/ /Sistêmico/ Preventivo e curativo	
	VIDEVAL TRIPLE (AFRASA) (Aplicação apenas com trator cabinado)				
	VITIPEC GOLD (QEMETICA)				
	ZAGAL TRIPLO (QEMETICA)				
	KATANGA TRIPLO(QEMETICA)				
	MEHARI – TRIPLO (PROPLAN))				
	MAGMA TRIPLE WG (AFRASA) (Aplicação apenas com trator cabinado)				
	MAGON TRIPLE (ADAMA)				
	ZOSTY TRIPLE (ADAMA)				
	DINAPIC TRIPLE WG				
ALBTKI(Aplicação apenas com trator cabinado)					
cimoxanil+folpete+ metalaxil (acetamida+ftalimida+fenilamida)	EKYP TRIO (ASCENZA)	Não fazer mais de 2 aplicações em cada ano	42*/28**	Penetrante /superfície/sistêmico/ Preventivo / curativo e anti-esporulante	

QUADRO 1-FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO MÍLDIO DA VIDEIRA EM 2025 (CONT. I)					
Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I. S	Modo de ação
cimoxanil+folpete+ metalaxil-M (acetamida+ ftalimida+fenilamida)	ACTLET EVO (SELECTIS)	Não fazer mais de 2 aplicações/ano, em uva de mesa apenas pode ser aplicado em pré floração	NÃO	28*/**	Penetrante /superfície/sistêmico/ Preventivo / curativo e anti-esporulante
	BOLTEX EVO (SELECTIS)				
cimoxanil+folpete+ tebuconazol (acetamida + ftalimida + triazol) (IBE-DMI)	VITIPEC COMBI AZUL (ASCENZA)	Ação simultânea anti-óidio	NÃO	42*	Penetrante /superfície/sistêmico/ Preventivo / curativo
Cimoxanil +zoxamida (acetamida +benzamida)	DUOSTAR WG (BECESANE) Limite utilização 31/07/2025	Para evitar resistências , não Para evitar resistências , não efetuar mais de 3 aplicações por ciclo cultural	NÃO		Penetrante com ação Penetrante com ação translaminar/ superfície/Preventivo e curativo (Quando aplicado logo após a infecção)
	LIETO (SIPCAMOX)			28	
	MILRAZ PRO (SIPCAM)			28	
cobre (oxicloreto) (inorgânico)	NEORAM MICRO (ISAGRO_SPA)	No conjunto dos tratamentos com produtos contendo cobre, não exceder a dosagem de 4 Kg de Cu/ha/ano Aplicação nos últimos 2 tratamentos, favorece o atempamento das varas	SIM	7	Fungicida de superfície/ Preventivo
	BLAURAME (IND_VALLÉS)			21	
	CUPRITAL (ASCENZA)				
	CUPRITAL SC (ASCENZA)		NÃO	7	
	CUPRAVIT (BAYER)				
	COBRE 50 SELECTIS (SELECTIS)				
	CURENOX 50 (IND_VALLÉS)		SIM	21	
	ULTRA COBRE (IND_VALLÉS)				
	EXTRA-COBRE 50 (IND_VALLÉS)				
	INACOP-L (INAGRA)		NÃO	15	
	COBRE FLOW CAFFARO (ISAGRO_SPA)				
	FLOWRAM CAFFARO (ISAGRO_SPA)				
	CUPROCAFFARO WG (ISAGRO)		SIM	21	
	FLOWBRIX (MONTANWERKE)				
	FLOWBRIX BLU (MONTANWERKE)				
	COZI 50 (VALLÉS) (limite comercialização até 21/07/2025)		NÃO	15	
	OXITEC 25% HI BIO (AMBEICHEM)				
	NUCOP M 35% HI BIO (AMBEICHEM)				
	NUCOP 25% HI BIO (ALBTKI)		SIM	21	
	NAYADES 380 KARYON)				
	CUPROXI FLO (ADAMA)				
	COPPER KEY (KEY)		SIM	21	
	COPPER KEY FLOW(KEY)				
	COPREN 25% HIBI (ALBTKI)				
	COBRE LAINCO		NÃO	15	
	CUPRA (LAINCO)				
	CODIMUR 50 (SARABIA)				
	CODIMUR SC (SARABIA)		SIM	21	
	CURENOX 52 FFLOW (IQV)				
	CUPROZIM 35 (SPIESS)				
	OXICUPER (SELECTIS)				
	PLATINUM FLOW(SPACHEM)		SIM	21	
	TRAXI 70 FLOW (BRANDT)				
	MARIMBA 35 WG (BELCHIM)				
cobre (oxicloreto + hidroxido de cobre)+benaxil-M (inorgânico fnilamida)	FANTIC A (ISAGRO)	Utilizar este produto após o aparecimento dos cachos visíveis e até o bago de chumbo	NÃO	28*/40**	Superfície/sistêmico/ Preventivo e curativo

QUADRO 1-FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO MÍLDIO DA VIDEIRA EM 2025 (CONT. II)					
Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I. S	Modo de ação
cobre (oxicloreto de cobre)+ iprovalicarbe (inorgânico+carbamato) (CAA)	MELODY COBRE (BAYER)	Usar só após a floração; Não fazer mais de 2 aplicações com este produto e 3 com produtos com o mesmo modo de ação (CAA)	NÃO	21	Superfície/penetrante c/ propriedades sistêmicas/Preventivo , curativo e anti-esporulante
cobre (oxicloreto de cobre)+ mandipropamida (inorgânico+mandelamida) (CAA)	AMPECIO C (SYNGENTA)	Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural com este ou outro produto do grupo CAA	NÃO	21	Superfície/penetrante c/ propriedades sistêmicas/Preventivo , curativo (quando aplicado logo após a infecção) e anti-esporulante
cobre (óxido cuproso) (inorgânico)	NORDOX® ENERGY (MASSÓ)	Máximo 5 aplicações,		21	Fungicida de superfície/ Preventivo
	COBRE NORDOX 75 WG (MASSÓ)	Máximo, 2 aplicações (2 últimos. tratamentos)		7	
cobre (hidróxido de cobre) (inorgânico)	KADOS (DUPONT)	Nunca aplicar durante a floração, se esta decorrer com tempo frio e chuvoso. Pode ter ação sobre geadas fracas, se aplicado antecipadamente. Não aplicar quando as condições são favoráveis à ocorrência de geadas fortes Não aplicar mais de 4 Kg de Cu/ha/ano	SIM	7	Fungicida de superfície/ Preventivo
	KOCIDE 2000 (DUPONT)				
	KOCIDE 35 DF (DUPONT)				
	KOCIDE OPTI (DUPONT)				
	CHAMPION WP (NUFARM_P)				
	CHAMPION FLOW (NUFARM_P)				
	COPERNICO 25% HIBIO (AMBECHEM)				
	HIDROTEC 20 % HI BIO (ALBTKI)				
	HIDROTEC 50% WP (SELECTIS)				
	CHAMPION WG (NUFARM_P)				
	HIDROCUPER WG (SELECTIS)				
	MAXI COPPER WG (ASCENZA)				
	IDROX 25 WG (MANICA)				
	VITRA 40 MICRO (IQV)				
cobre (hidróxido+ oxicloreto de cobre (inorgânico)	GRIFON (ISAGRO)	Não aplicar mais de 4 Kg de Cu/ha/ano, no conjunto dos produtos com cobre. Dosagens pré e pós floração diferentes		21	
	CUPRANTOL DUO (ISAGRO)				
cobre (hidróxido+ oxicloreto de cobre) + benaxil M (inorgânico+fenilamia)	FANTIC A (ISAGRO)	Não fazer mais de 2 aplicações por ciclo cultural	NÃO	28/ 40**	Superfície/ sistêmico/Preventivo/ curativo e anti-esporulante
cobre (hidróxido+ oxicloreto de cobre) + valifenalato (inorgânico+ valinamida carbamatos (CAA)	GORILLA PLUS (BELCHIM)	Não fazer mais de 2 aplicações por ciclo cultural		28	Superfície/ movimento translaminar, penetrante e de difusão /Preventivo/ curativo/anti-esporulante
cobre (oxicloreto de cobre)+ metalaxil-M (inorgânico+fenilamida)	RIDOMIL GOLD R WG (SYNGENTA)	Não fazer mais de 2 aplicações por ciclo cultural		20	Sistêmico/Preventivo e curativo
cobre (sulfato de cobre tribásico) (inorgânico)	NOVICURE (UPL)	Realizar no máximo 5 aplica. no mesmo solo agrícola, com este produto não excedendo 4 Kg de cobre/ha/ano no conj. dos produtos que contenham cobre	SIM	21	Superfície/ Preventivo
cobre (sulfato de cobre tribásico) (inorgânico)	CUPROXAT (NUFARM_P)	Nunca aplicar durante a floração se esta decorrer com tempo frio e chuvoso.		7	Superfície/ Preventivo
cobre (sulfato de cobre tribásico)+ fosetil (sal alumínio) (inorganico + organofosfonato))	OPTIX R (UPL) <i>(limite de utilização até 31/07/2026)</i>	Aplicar o Optix R preventivamente a partir da floração.	NÃO	28	Superfície/Sistêmico/Prev entivo
cobre (sulfato cobre e cálcio – mistura bordalesa) (inorgânico)	MANIFLOW (MANICA)	Não aplicar este produto durante a floração, principalmente se esta decorrer com o tempo frio e chuvoso.	SIM	21	Superfície/Preventivo
	CALDA BORDALESA ASCENZA				
	CALDA BORDALESA ASCENZA SC				
	CALDA BORDALESA QUIMIGAL (VALLÉS)				
			Não	7	

QUADRO 1-FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO MÍLDIO DA VIDEIRA EM 2025 (CONT. III)					
Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I. S	Modo de ação
<u>cobre</u> (sulfato cobre e cálcio – <u>mistura bordalesa</u>) (inorgânico)	CALDA BORDALESA QUIMAGRO	Não aplicar este produto durante a floração, principalmente se esta decorrer com o tempo frio e chuvoso.	SIM	7	Superfície/Preventivo
	CALDA BORDALESA SELECTIS			21	
	BORDALESA SELECTIS 124 SC		SIM		
	CALDA BORDALESA AZUL (VALLÉS)				
	CALDA BORDALESA CAFFARO 20 (GCP)				
	CALDA BORDALESA VALLÉS				
<u>cobre</u> (sulfato cobre e cálcio <u>mistura bordalesa</u>)+ <u>cimoxanil</u> (inorgânico+acetamida)	INACOP PLUS BLUE (VALLÉS) (<u>limite venda até 04/08/2025</u>)	Não fazer mais de 4 aplicações em cada ano		21	Superfície/penetrante/pr eventivo e curativo
	CURAME POLTIGLIA (MANICA)			20	
	CUPERTINE SUPER (IQV)			21	
<u>cobre</u> (oxicloreto de cobre)+ <u>fosetil de alumínio+cimoxanil</u> (inorgânico+organometálico + acetamina)	VITENE TRIPLO R (SIPCAM)	Não fazer mais de 4 aplicações /ciclo cultural Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado	Não	40	Penetrante/sistémico e de contacto com actividade preventiva e curativa
<u>cobre</u> (hidróxido de cobre) + <u>metalaxil M</u> (inorgânico+ fenilamia)	ACTLET C (ASCENZA)	Realizar no máximo 2 tratamentos anuais, no conjunto das doenças, com este ou outros fungicidas do grupo das fenilamidas.			28
	BOLTEX C (SELECTIS)				
	HIDROXYL (UPL IBERIA)				
<u>cobre</u> (hidróxido de cobre) + <u>metalaxil M</u> (inorgânico+ fenilamia)	MAHAGONY (ALBTKI)	(Continuação) Utilizar no período de maior pressão de míldio (G/I), não aplicar após a fase “Bago grão de chumbo.”	Não	28	Superfície/ sistémico/Preventivo/ curativo e anti-esporulante
	CYCLO MAX SC (EPAGRO)				
<u>Cos-oga</u> (Extratos de plantas /crustáceos)	FYTOSAVE (FYTOFEND)	Nº máximo de aplicações -8, aplicação antes do aparecimento da doença	SIM	3	Preventivo/ativador das defesas naturais das plantas
<u>Ditianão</u> (quinona)	DELAN SC (BASF)	Realizar no máximo 4 tratamentos por ano	NÃO	49	Superfície/Preventivo
<u>Folpete</u> (ftalimida)☹	FLEXI 80 WG (SHARDA)	Alguns fungicidas com a s. ativa folpete não devem ser utilizados em vinhas para produção de uvas de mesa; ou apenas podem ser utilizados até à floração *** Atenção ao período de reentrada nas parcelas, para tarefas que durem mais de 2 horas, 24 a 27 dias (dependendo da quantidade de produto utilizado) após a aplicação, com o produto Folder 80 WG. (Consultar rótulo dos produtos)		28*	Superfície/Preventivo
	FOLDER 80 WG(UPLHCOOP)			28*/ 56**	
	FOLLOW 80 WG (SHAEUR)			28*	
	FOLPETIS SC (SELECTIS)			28*	
	FOLPETIS WG (SELECTIS)			34	
	FOLPAN 80 WDG (ADAMA)			42*/ 56**	
	FOLTAX 80 WG (ADAMA)			42*/ 56**	
	FOL-HI TEC (SHARDA)			28*	
	FOLPEC 50 (SAPEC)			34*	
	FOLPEC 50 SC (ASCENSA)			28*	
	FOLPEC 50 AZUL (SAPEC)			34*	
	FOLLET 80 WG (SHARDA)			28*	
	FOLPEC 80 WG (ASCENZA)			28*	
	FOLMAK (ADAMA)			42*/ **56	
	SLEDOVAT (AUVRONE)			28*	
<u>folpete</u> + <u>azoxistrobina</u> (ftilamina+estrobilurina) QoI	QUADRIS MAX (SYNGENTA)	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 3 tratamentos por campanha e no conjunto das doenças com produtos contendo QOL	NÃO	28	Penetrante com mobilidade Translaminar e lateral e sistemica via xilémica/ atividade essencialmente Preventiva e anti-esporulante, algum ação curativa
	TAGUS F (SELECTIS)				
	TRUNFO F (SAPEC)				
<u>folpete</u> (ftilamina) + <u>ciazofamida</u> (ciano-imidazol) (QIL)	VIDERYO F (ISK)	Realizar no máximo 2 tratamentos por ano, com este produto. Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar produtos que contenham Qil, mais de 3 vezes por ano.	NÃO	28*/ 70**	Superficie/Penetrante mobilidade translaminar/ Preventivo

QUADRO 1-FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO MÍLDIO DA VIDEIRA EM 2025 (CONT. IV)					
Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I. S	Modo de ação
folpete+ cimoxanil (ftalimida +(acetamida)	VITYPEC AZUL (ASCENZA)	Realizar no máximo 3 tratamentos, por ciclo cultural, com estes ou outros produtos que contenha CAA.	NÃO	42*	Penetrante/Superfície/ Preventivo e curativo, quando aplicado logo após a infeção
folpete+ benalaxil-M (ftilamina+ fenilamina)	FANTIC F (ISAGRO_SPA)	Não efectuar mais que 2 aplicações com este fungicida ou outro do grupo das fenilamidas.	NÃO	28*	Superfície/ sistémico/Preventivo/ curativo e anti-esporulante
	SAVIRAN STAR (ISAGRO_SPA)				
	SIDECAR F (GOWAN C PROTECTION)				
	STADIO F (ISAGRO_SPA)				
folpete+fosetil (sal alumínio) (ftalimida + organofosfonato)	RHODAX FLASH (BAYER)	Alguns fungicidas com a s. ativa folpete não devem ser utilizados em vinhas para produção de uvas de mesa; ou apenas podem ser utilizados até à floração*** (Consultar rótulo do produto)	NÃO	42*	Superfície/Sistémico/ Preventivo/ Ligeira ação curativa
	VIDEVAL VALLÉS (IQV)				
	MAESTRO F (SAPEC) (limite utilização 11/10/2025)				
	MAESTRO F AZUL (ASCENZA) (limite utilização 11/10/2025)				
	MAESTRO F WG ADVANCE (ASCENZA)				
	ZETYL COMBI AZUL (ASCENZA)) (limite utilização 22/10/2025)				
	ZETIL COMBI WG (SELECTIS)				
	ZETIL COMBI (SELECTIS)) (limite utilização 20/9/2025)				
folpete+fosetil-alumínio+iprovalicarbe (CAA) (ftalimida+organometálico+carbamato)	MELODY SUPER (BAYER)	Não realizar mais de 3 tratamentos por campanha, com estes ou outros fungicidas, contendo CAA. O folpete em vinhas para produção de uvas de mesa; não pode ser utilizado, ou apenas é permitida a sua utilização em pré-floração. Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural	NÃO	42*	Superfície/ Sistémico/ Penetrante c/ propriedades sistémicas/ Preventivo/ Curativo e anti-esporulante.
folpete+iprovalicarbe (ftalimida+carbamato) (CAA)	MELODY (BAYER)		NÃO	42*	É um fungicida de superfície e penetrante c/ propriedades tem actividade preventiva e curativa e anti-esporulante.
folpete+mandipropamida (ftalimida + mandelamida) (CAA)	MANDATÓRIO F (UPL IBERIA)		NÃO	28*	Superfície/penetrante /preventivo/ e anti-esporulante
	PERGADO F (SYNGENTA)			28*	
folpete+metalaxil (ftalimida + fenilamida)	EKYP COMBI (ASCENZA)		Alguns fungicidas que contenham folpete em produção de uvas de mesa; apenas podem ser aplicados até à floração Não fazer mais de 2 aplicações por ciclo cultural	NÃO	28**/42*
	EKYP COMBI AZUL (ASCENZA)	28**/42*			
	ARMETIL 50 (VALLÉS)	28*/56**			
	MEVAXIL COMBI (VALLÉS)	28**/42*			
	FOLPAXIL (SELECTIS)	28*/42**			
	FOLPAXIL AZUL (SELECTIS)				
folpete+metalaxil-M (ftalimida + fenilamida)	CYCLO M PLUS (AFRASA)	Em uva de mesa, aplicações apenas até à floração**, não efetuar mais de 2 aplicações por ciclo cultural	NÃO	28*/**	Superfície /Sistémico/ Preventivo/ Curativo e anti-esporulante
	BOLTEX F (SELECTIS)				
	ACTLET F (ASCENZA)				
	MILDOR COMBI F (AGCHEML)	Realizar no máximo 2 tratamentos com este produto ou outro do grupo químico das fenilamidas.		42*	
	FOLPAN GOLD (ADAMA)				
	RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE (SYNGENTA)				
folpete+ oxatiapiprolina (ftalimida + piperidinil-tiazol-oxatia) (OSBP)	ZORVEC™ VINABRIA™ (CORTEVA)	Realizar no máximo 2 tratamentos até ao estado fenológico do vingamento (BBCH 13-71). Recomendado tratamento em bloco, com 2 aplicações consecutivas com 10 a 14 dias de intervalo entre aplicações no período mais sensível (floração/vingamento)	NÃO	56	Superfície/movimento sistémico na folha (difusão), translaminar / Preventivo/ Curativo e anti-esporulante
folpete+ piraclostrobina (caa) (ftalimida + estrobilurina)	CABRIO STAR (BASF)	Não fazer mais de 2 aplicações consecutivas e 3 aplicações no total. Controla simultaneamente oídio e Black rot		42*	Superfície/Penetrante translaminar/Preventivo/ curativo limitado

QUADRO 1-FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO MÍLDIO DA VIDEIRA EM 2025 (CONT. VI)					
Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I. S	Modo de ação
fosfanatos de potássio (fosfanato+ ametoctradina (pirimidilamina) (QOSI)	ENERVIM® PRO PACK (BASF)	Pack contendo 3L de Enervin® SC (ametoctradina)e 4L de Soriale® (fosfanato de potássio).	NÃO	35	Superfície –adesão ceras cuticulares/ Sistémico/ preventivo/Estimula a defesa natural das plantas
fosfanato de potássio + Ditianão (fosfanato +quinona)	ENVITA (BASF)	Não fazer mais de 4 aplicações/ ano, apenas em uvas para vinificação	NÃO	42*	Sistémico /Superfície/ Preventivo/Estimula as defesas naturais das plantas
fosfanato de potássio + folpete (organofosfonato + ftalimida)	RODAVIN ENERGY(ADAMA)	Realizar no máximo 5 tratamentos com este produto e no total dos fungicidas com fosetil, fosfonato, Não aplicar depois de finais de Julho..	NÃO	28	Sistémico /Superfície/ Preventivo/Estimula as defesas naturais das plantas
Fluopicolida (benzamida) + fosetil (sal de alumínio) (organometálico)	PROFILER (BAYER)	Não fazer mais de 2 aplicações por ciclo cultural		28	Penetrante translaminar /sistémico / estimula as defesas naturais das plantas. Preventivo e anti-esporulante.
Fluaziname (2,6- dinitroanilinas)	BANJO (ADAMA)	Aplicar o produto em mistura com fungicidas anti-míldio sistémicos ou penetrantes. apenas uma aplicação por ciclo cultural. Tem simultaneamente ação sobre a Podridão cinzenta	NÃO	21*	Superfície c/atividade preventiva multi-sítio
	TIZCA (FMC- ES)			28*	
mandipropamida+ zoxamida (mandelamida+benzamida) (CAA)	AMPEXIO (SYNGENTA)	Realizar no máximo 3 tratamentos, posicionados até ao pintor, com este produto ou outros fungicidas que contenham CAA e zoxamida		21	Penetrante na camada cerosa/Preventivo/ Curativo quando aplicado logo após a infeção / anti-esporulante
mandipropamida (mandelamida.) + Oxatiapirolina (piperidinyl-thiazole-isoxazoline) (CAA +OSBP)	ORONDIS ULTRA (SYNGENTA)	Realizar no máximo 2 tratamentos por campanha/ano, com este produto		21	Movimento sistémico ascendente via xilema/Translaminar / Preventivo e Curativo
Metalaxil (fenilamida)	RIDOMIL 25 (IQV)	Para evitar resistências, não fazer mais de 2 aplicações em cada ano		14	Sistémico com , atividade preventiva e curativa
	ARMETIL 25WP (IQV)		14		
Metalaxil + Cobre (hidróxido) (fenilamida +inorgânico)	CYCLO R-líquido (AFRASA)	Iniciar os tratamentos após a floração , até ao fecho dos cachos (BBCH 68/69-79). Máximo 2 tratamentos	56	Contacto/Sistémico com , atividade preventiva e curativa (quando aplicado logo após condições de infeção)	
Oxatiapirolina (piperidinyl-thiazole-isoxazoline) (OSBP)	ORONDIS (CORTEVA)	Não fazer mais de 2 aplicações, com este produto ou outro que contenha oxatioprirolina (OSBPI).	NÃO	14	Movimento sistémico ascendente via xilema/Translaminar / Preventivo/ Curativo
	ZORVEC™ZELAVIN™ (CORTEVA))				
Oxatiapirolina (piperidinyl-thiazole-isoxazoline) (OSBP) + Folpete (ftalimida)	ZORVEC™ VINABRIA™ (CORTEVA))	Realizar no máximo 2 tratamentos até ao estado fenológico do vingamento (BBCH 13-71).		56	Movimento sistémico ascendente via xilema/Translaminar e contato/ Preventivo/ Curativo
Oxatiapirolina (piperidinyl-thiazole-isoxazoline) + zoxamida (benzamida) (OSBP)	ZORVEC VINABEL (CORTEVA))	Realizar no máximo 2 Tratar até ao fecho do cacho, (BBCH 15-79).		28	
piraclostrobina (estrobilurina) (QoI)	CABRIO (BASF)	Não fazer mais de 3 aplicações por ciclo cultural Ação simultânea anti-oídio		35	Penetrante Translaminar/ Preventivo /Curativo limitado
óleo de laranja	PREV-AM® (OAEU)	Não fazer mais de 6 (* apenas 2) aplicações por ciclo cultural desde /até (BBCH 12-77). Previne simultaneamente o Oídio e Botrytis	SIM	1	Contato/Curativo provoca a desidratação das paredes celulares dos esporos dos fungos.
	PREV-AM® PLUS (OAEU)				
	PREV-AM® ULTRA (OAEU				
	*ORACIDE® (OROAGRI)				
	SINALA (OAEU)				
	LIMOCIDE (VIVAGRO)				

QUADRO 2-FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE À PODRIDÃO NEGRA (BLACK-ROT) DA VIDEIRA EM 2025					
Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I.S. (dias)	Modo de ação
azoxistrobina (estrobilurina) (Qoi)	QUADRIIS (SYNGENTA)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano e no total das doenças; combate simultaneamente o míldio, escoriose e o oídio	NÃO	21	Penetrante com mobilidade translaminar e lateral/ Preventivo/ Anti-esporulante e com alguma atividade curativa
azoxistrobina+folpete (estrobilurina + ftalimida) (Qoi)	QUADRIIS MAX (SYNGENTA)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano e no total das doenças; combate simultaneamente o míldio, oídio e escoriose.		28*	Superfície/ Penetrante com mobilidade translaminar e lateral/ Preventivo/ Anti-esporulante e com alguma atividade curativa
	TAGUS F (SELETIS)				
	TRUNFO F (ASCENZA)				
cobre (hidróxido + oxicleto) (inorgânico)	GRIFON (ISAGRO)	Não ultrapassar a dosagem de 4 KG de cobre/ha/ano no mesmo solo agrícola. Combate simultaneamente mildio	SIM	21	Superfície/preventivo
	CUPRANTOL DUO (ISAGRO)				
cresoxime-metilo (estrobilurina) (Qoi)	DECIBEL (SELECTIS)	Não efetuar mais de 2/3 tratamentos (mais de 2 consecutivos), por ano e no total das doenças; combate simultaneamente o oídio	Não	35	Penetrante- Translaminar e ação de vapor/ Preventivo/ curativo/ anti-esporulante
	STROBY WG (BASF)			42*/35**	
	SUGOBY (LAINCO)			35	
	KSAR (ASCENZA)				
	KRETHOR (LAINCO)				
	CRATER(ALBTKI)				
	VALKROM (AFRASA)				
	QUIMERA (EPAGRO)				
cresoxime-metilo+penconazol (estrobilurina + triazol) (Qoi/IBE-DMI)	ARRIOSTA (SELECTIS)			35	
	KSAR VITIS (ASCENZA)			35	
difenoconazol (triazol) (IBE-DMI)	SCORE 250 EC (SYNGENTA)	Não efetuar mais de 2 a 3 tratamentos, por ano com este ou outro produto do grupo dos DMI, no conjunto das doenças/ano (consultar rótulo)	Não	21	Penetrante com Sistemía localizada/Translaminar / Preventivo/ curativo
	SHIELD (IQV AGRO PT)				
	GALAVIO (SYNGENTA)				
	BLIN 25 EC (SYNGENTA)				
	DITTO (SHAESP)				
	DIFENOFIM (JOVARGO)				
	MAVITA 250 EC (ADAMA)				
	ZANOL (AGCHEM)				
	INVICTUS (SELETIS)				
	CERIMONIA (ASCENZA) Limite de utilização até 11/07/2026				
	DIZOLE (ASCENZA)				
difenoconazol+ espiroxamina (triazol+ spirocetalamidas) (IBE-DMI)	SPIROX D (ARISTA)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano. Combate simultaneamente o oídio.Em uva de mesa deve ser apenas usado até ao final da floração	35	Penetrante com Sistemía localizada/Translaminar /Sistémico/ Preventivo/ curativo e erradicante	
Ditianão (quinonas)	DELAN SC (BASF)	Realizar no máximo 4 tratamentos por ano.	49	Preventivo/superfície	
Ditianão + fosfanato de potássio (quinonas + ácido fosfórico)	ENVITA (BASF)	Realizar no máximo 4 aplicações por campanha, previne simultaneamente míldio e escoriose	42	Preventivo/superfície/si sitémico com ação preventiva	
folpete (ftalimida)	FOL-HITEC (AGGCHEM)	Não efetuar mais de 8 aplicações por ano. Fungicidas que contenham folpet na sua composição, não poderão ser utilizados em uvas de mas*, ou em alguns casos apenas até à floração (consultar o rótulo) Atua simultaneamente no combate ao míldio, escoriose e podridão cinzenta.	28	Superfície/ Preventivo	
	FLEXI 80 WG (SHARDA))				
	FOLLET 80 WG (SHARDA)				
	FOLPEC 80 WG (ASCENZA)				
	FOLLOW 80 WG (SHARDA)				
	SLEDOVAT (AUVRONE)				

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE À PODRIDÃO NEGRA (BLACK-ROT) DA VIDEIRA EM 2025

Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I.S. (dias)	Modo de ação
Folpete + Piraclostrobina (ftilamina+estrobilurina) (Qol)	CABRIO STAR (BASF)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano com este ou outro Qol, no conjunto das doenças.; combate simultaneamente o oídio e míldio. Não efetuar mais que dois tratamentos consecutivos	NÃO	42*	Superfície/penetrante translaminar/Preventivo / curativo.
Mefentrifluconazol - Triazol (IBE-DMI))	REVYSION (BASF)	Não efetuar mais de 3 tratamentos Para evitar eventuais problemas de fitotoxicidade em videira, após a alimpa, não misturar o REVYSION com produtos contendo ditianão		21	Penetrante , com mobilidade translaminar e sistêmica. Preventivo/curativo
Tebuconazol (triazol IBE)	KADIMA (ROTAM)	Não efetuar mais de 3 tratamentos por ano; combate simultaneamente, o oídio		14	Movimento sistémico/ penetrante/Preventivo /Curativo
	DIVINUS (ROTAM)				
	UIYSSES (JOVAGRO)				
<u>tebuconazol+trifloxistrobina</u> (triazol + estrobilurina) (IBE-DMI+Qol)	FLINT MAX (BAYER)	Não efetuar mais de 2 tratamentos, tem ação simultânea anti-oídio		35	Movimento sistémico /Penetrante com mobilidade translaminar e lateral e ação de vapor/ Preventivo/curativo/
<u>trifloxistrobina</u> (estrobilurina) (Qol)	CONSIST (BAYER)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano e no total das doenças; combate simultaneamente o oídio.			Absorvido pelas camadas cerosas das folhas e posteriormente distribuído por ação de redeposição e vapor Penetrante com mobilidade lateral Preventivo
	SAFIRA (GLOQUIM)				
	FLINT (Bayer)				

Estação de Avisos de Entre Douro e Minho

Fonte: sifito.dgav.pt (consulta em 15/01/2025)

LEGENDA: [MPB](#) – Modo de produção biológico; I.S. – Intervalo de segurança *uvas para vinificação/**Uvas de mesa

A informação apresentada não dispensa a consulta do Rótulo/Ficha Técnica dos produtos.

QUADRO 3-FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE À PODRIDÃO CINZENTA (BOTRYTIS) NA VIDEIRA EM 2025					
Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I.S.	Modo de ação
<i>Aureobasidium pullulans</i> (estirpes DSM 14940 e DSM 14941) (microorganismo)	BOTECTOR (BIO-FERM/NUFARM)	Microrganismo, composto por duas estirpes do fungo <i>Aureobasidium pullulans</i> . Ação antagonista em fungos e bactérias. Atua por competição, com o patogéneo , por nutrientes e espaço. Máximo 4 aplicações	SIM	1	Preventivo
<i>Bacillus amyoliquefaciens</i> QST 713 (microorganismo)	SERENADE ASO (BAYER)	Ação antagonista em fungos e bactérias. Atua por competição, com o patogéneo , por nutrientes e espaço.. Máximo 4 aplicações		3	
<i>Bacillus amyoliquefaciens</i> estirpe AH2 (microorganismo	BOTRYBEL (PROBELTE) KIPLANT METACARE (PROBELTE)	O modo de ação do produto inclui vários mecanismos incluindo competição por espaço e nutrientes, com os microrganismos patogénicos. indução dos mecanismos de resistência das plantas. Máximo 3aplicações		1	
<i>Bacillus amyoliquefaciens</i> estirpe MBI 600 (microorganismo	SERIFEL (BASF)	Ação antagonista em fungos e bactérias. Atua por competição, com o patogéneo, por nutrientes e espaço.. Induz resistências por parte da planta. Na podridão cinzenta dos cachos (Botrytis cinerea), o SERIFEL® actua parando a germinação dos esporos e interrompendo o crescimento micelial, modificando a estrutura da membrana. Máximo 10 aplicações		3	
<i>Bacillus amyoliquefaciens</i> subsp. plantarum, estirpe D747 (microorganismo	AMYLO-X WG (MITSUI)	Ação antagonista em fungos e bactérias. Atua por competição, com o patogéneo , por nutrientes e espaço.. Induz resistências Máximo 6 aplicações		3	
<i>Bacillus amyoliquefaciens</i> estirpeFZB24 (microorganismo	TAEGRO (NOVOZYM)	Ação antagonista em fungos e bactérias. Atua por competição, com o patogéneo, por nutrientes e espaço.. Máximo 10 aplicações		1	
Extrato aquoso de sementes germinadas de Lupinus albus doce	PROBLAD (CEV/LUSOSEM)	Realizar no máximo 4 tratamentos (desde floração/alimpa maturação) por ano, no conjunto das doenças. Tem ação sobre a Oídio.		-	Contacto/Penetrante, ação multi-sítio
<i>bacillus subtilis</i> estirpe IAB/BS03 (microorganismo)	FUNGISEI (SEIPASA)	Atua por competição por espaço e nutrientes com os agentes patogénicos- Indutor dos mecanismos de defesa das plantas Máximo 5 tratamentos por campanha	SIM	1	Preventivo
<i>Pythium oligagandrum</i> estirpe M1 (microorganismo)	POLYVERSUM (AGRICHEM)	Micoparasitas dos fungos patogénicos, colinizam, estimulam e induzem resistências nos tecidos , quer das raízes, quer da parte aérea das culturas. Máximo 4 aplicações.		-	
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> estirpe IAS02 (microorganismo	JULIETA (AGX)	Ação antagonista em fungos e bactérias. Atua por competição, com o patogéneo, por nutrientes e espaço Em anos de incidência normal, 4 tratamentos, em anos de maior incidência realizar um máximo de 6 tratamentos		1	
	HIVA (AGX)				
<i>Trichoderma atroviride</i> SC1 (microorganismo)	VINTEC® (Bi-PA EC	Fungo antagonista, que possui atividade preventiva.Tem como principal modo de ação , entrar em competição por espaço e nutrientes com os agentes patogénicos. Indutor dos mecanismos de defesa das plantas. Aplicar a partir da queda de 80% dos estames (BBCH 68) Máximo 4 aplicações.	1		

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE À <u>PODRIDÃO CINZENTA (BOTRYTIS)</u> NA VIDEIRA EM 2025(CONT I)						
Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I.S.	Modo de ação	
hidrogenocarbonato de potássio (inorgânico)	ARMICARB (CERTBEL)	Máximo 8 aplicações.Em uva de mesa aplicar antes do vingamento. A aplicação do produto pode causar marcas e rugosidades nos bagos, Trata simultaneamente o controlo do oídio.	SIM	1	Superfície/ Preventivo	
	BIO FUNGICIDA STOP	Aplicar preventivamente a partir do inico do florescimento e até os frutos apresentarem a coloração típica da maturação (BBCH 61-89)				
cerevisana (Saccharomyces cerevisiae)	ROMEO (KENUGARD)	Indutor das defesas naturais das plantas. Máximo 10 aplicações		1	Preventivo	
	EBUIM (AGX)					
boscalide (carboximida) (SDHI)	VINITUS (GLOB)	Não efetuar mais de 1 aplicação	Não	21	Propriedades sistémicas /Preventivo	
	IOZZARE (UPLHCOOP)					
	BOSCAVI (SHAESP)					
	BOSCAOVA (SHAESP)					
	BOSCAIK 50 WG (SHAESP)					
	BOSKET (RAINBOW)					
	CLAPSLAV (AUVERONE)					
	CANTUS (BASF)					
ciprodinil (anilinopirimidina)	CARDINAL (SELECTIS)	Não efetuar mais de 1 aplicação.		14*/7**	Sistémico/ Superfície/Preventivo/Cu rativo	
	EQUADOR (SAPEC)			7**		
	QUALY (ADAMA)			21*/7**		
ciprodinil+fludioxonil (anilinopirimidina + cianopirrole)	SWITCH 62.5 WG (SYNGENTA)	Não efetuar mais de 2 tratamentos por campanha, trata simultaneamente o oídio				
	SPEECH (GLOB)					
	BOTREFIN (JOVARGO)					
ciprodinil+tebuconazol (anilinopirimidina + triazol) (IBE-DMI)	BENELUS (ADAMA)	Não efetuar mais de 1 tratamentos por campanha			21*/28* *	Sistémico/Penetrante com movimento sistémico no xilema e difusão lateral/Atividade preventiva e curativa
eugenol+geraniol+timol (terpenos)	ARAW (EDEN)	É um fungicida com base em extratos de plantas	Sim	3*/7**	Preventivo/curativo Inibe a germinação dos esporos e o crescimento do micélio.	
fenehexamida (carboxamida) (IBE)	TELDOR SC(BAYER)	Não efetuar mais de 2 tratamentos por cultura, alternar com produtos com outro modo de ação	Não	14*/7**	Superfície/ Preventivo/acção penetrante e mobilidade translaminar	
	TELDOR (BAYER)					
	TELDOR HORTO SC(BAYER)			21*	Superfície/ Preventivo	
	SONAR (BAYER)					
fludioxonil (fenilpirrole)	GOLEN (SYNGENTA)	No máximo 2 aplicações por cultura		21*		
	GEOXE (SYNGENTA)			21*/7**		
fluaziname (2,6-dinitroanilina)	TIZCA (FMC)	Não efetuar mais de 1 tratamentos, posicionado no fim da floração, ou antes do fecho do cacho, ou ao amadurecimento do cacho		28*	Contacto/preventivo	
	FLUAZIK 500 (AUVERONE)			21		
	FLUAZISTAR (AUVERONE)			21*		
	BANJO (ADAMA)			21**		
	ABANTE (FINCHIM)	Não efetuar mais de 3 tratamentos. Apenas para uvas de mesa				
	FLUAZINOVA (FINCHIM)					
fenepirazamina (amino-pyrazolinone) IBE	PROLECTUS (NUFARM)	Efetuar apenas 1 tratamentos por campanha no conjunto dos fungicidas que contenham fenepirazamina e fenehexamida		14*/7**	Penetrante/translaminar /preventivo e curativo/anti-esporulante	
folpete (ftalamina)	FOLLOW 80 WG (NUF/SHARDA)	Máximo 8 tratamentos e apenas em uvas para vinificação. Este produto possui uma ação secundária no controlo da podridão cinzenta, quando usado na proteção do mildio.	Não	28*	Contacto/ Preventivo	
	FLEXI 80 WG (SHAESP)					
	FOLIET 80 WG (AGROTOTAL)					
	FOLPETIS (SELECTIS) limite utilização até 31/01/2026					
	FOLPEC 80 WG (ASCENZA)					
	SLEDOVAT (EUVERONE)					
	FOL-HITEC (SHAESP)					
isofetamida (phenyl-oxo-ethyl thiophene)	KRYOR (ISK)	Efetuar apenas 1 tratamentos por campanha, a partir do fim da floração.		21	Preventivo/ Contato,mobilidade translaminar	
	KENJA (BELCHIM)					
	ZENBY (ISK)					
pirimetanil (anilinopirimidina)	MALAKITE (BASF)	Não efetuar mais que um tratamento por campanha com estes produtos ou com outros com o mesmo modo de ação			21	Penetrante/ Translaminar e com ação devapor/Preventivo/Cura tivo

QUADRO 4 -FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO OÍDIO DA VIDEIRA EM 2025						
Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I.S. (dias)	Modo de ação	
azoxistrobina (estrobilurina) (Qol)	QUADRIIS (SYNGENTA)	Não efetuar mais de 2 a 3 tratamentos, por ano e no total das doenças (consultar rótulo); Proteção simultânea contra o míldio e o black rot	NÃO	21	Penetrante c/ mobilidade Translaminar e lateral/ Preventivo/ /anti-esporulante e alguma atividade Curativo	
	SINSTAR (AGROLAC)					
	AZAKA(FMC)					
	AZBANY PRO (NUFARM)					
azoxistrobina+ folpete (estrobilurina + ftalimida) (Qol)	QUADRIIS MAX (SYNGENTA)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano e no total das doenças; Proteção simultânea contra o míldio, escoriose e Black Rot. Não aplicar em videiras de uva de mesa		28*	Superfície/Penetrante c/ mobilidade Translaminar e lateral/ Preventivo/ /anti-esporulante e alguma atividade Curativa	
	TAGUS F (SELECTIS)					
	TRIUNFO F (SAPEC)					
azoxistrobina+ tebuconazol (estrobilurina + triazol) (Qol+IBE-DMI)	CUSTODIA (ADAMA)	Não efetuar mais de 2 tratamentos, por ano e no total das doenças, com este ou outro fungicida do mesmo grupo.			21	Penetrante c/ mobilidade Translaminar, lateral/e sistêmica/Preventivo/ Curativo e anti-esporulante
boscalide+cresoxime-metilo (carboximida+estrobilurina) (SDHI-Qol)	COLLIS (BASF)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano e no total das doenças, com este ou outro fungicida do mesmo grupo. Apenas 2 tratamentos consecutivos		28	Sistêmico / Penetrante, com mobilidade translaminar e ação de vapor/ Preventivo/curativo/anti-esporulante	
Bupirimate (pirimidina)	NIMROD (ADAMA)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano e no total das doenças, com este ou outro fungicida do mesmo grupo		14	sistêmico de acção translaminar e fumigante, com acção preventiva e curativa e anti-esporulante	
Calda sulfo-cálcica (óxido de cálcio (da cal virgem) + enxofre (inorgânico))	CURATIO (BIOFA)	Realizar 1 tratamento em pré-floração, 1 durante a floração e os restantes depois da floração. Aplicar no máximo 12 L/há no total das aplicações (Max. 5)	Sim	30	Superfície (Atua por contato e libertação de vapores)/ Preventivo/curativo e anti-esporulante	
ciflufenamida (fenil-acetamida)	CIDELY (SYNGENTA)	Não efetuar mais de 2 tratamentos, por ano e no total das doenças, com este ou outro fungicida do mesmo grupo. A partir do "bago de chumbo" as aplicações devem dirigir-se especialmente aos cachos para melhor proteção.		21	Penetrante, com mobilidade translaminar e ação de vapor. Atividade preventiva e curativa	
	NISSODIUM (NISSO)				Penetrante, com mobilidade translaminar e ação de vapor/ Atividade preventiva e curativa e anti-esporulante	
	CYFLAMID (SIPCAM_P)					
ciflufenamida+difenoconazol (fenil-acetamida + triazol) (IBE-DMI)	DYNALI (SYNGENTA)					
cimoxanil+folpete+tebuconazol (acetamida+ftalimida+ Triazol) (IBE-DMI)	VITIPEC COMBI AZUL (HELM AG)	Máximo de 3 aplicações, combate simultaneamente míldio e oídio. Não aplicar em videiras de uva de mesa		42*	Superfície /Penetrante/ com movimento sistêmico/ Preventivo/curativo	
cresoxime-metilo (estrobilurina) (Qol)	STROBY WG (BASF)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano e no total das doenças. Combate simultaneamente o black rot		42*/35**	35	Penetrante c/ mobilidade Translaminar e lateral/ Preventivo/ anti-esporulante e algum poder curativo
	SUGOBY (LAINCO)					
	KSAR (ASCENZA)					
	DECIBEL (SELECTIS)					
	QUIMERA (EPAGRO)					
	KRETHOR (LAINCO)					
	VALKROM (IQV Agro PT)					
cresoxime-metilo+penconazol (estrobilurina+ triazol) (Qol+IBE-DMI)	ARRIOSTA (SELECTIS)			35	Penetrante c/ mobilidade Translaminar e lateral/ Preventivo/ Curativo e anti-esporulante	
	KSAR VITIS (ASCENZA)			28		
cresoxime-metilo+boscalide (estrobilurina+carboximida) (Qol+SDHI)	COLLIS (BASF)	Não efetuar mais de 3 tratamentos		21		
difenoconazol (triazol) (IBE-DMI)	DIZOLE (REFLEX)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, no total das doenças. Com este ou outros fungicidas do grupo DMI				

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO OÍDIO DA VIDEIRA EM 2025(CONTINUAÇÃO II)						
Observações	MPB	Observações	MPB	I.S.	Designação comercial	
Enxofre (inorgânico)	AZUFEGA DISPERS WG(AJF)	Nº máximo de aplicações -4		1	Atua por contato e libertação de vapores/ Preventivo/ curativo/Anti- Esporulante	
	AZUFEGA OXIDANTE (AJF)	Nº máximo de aplicações -4		1		
	RIOSUL OXIDANTE (AJF)	Nº máximo de aplicações -4		1		
	RIOSUL 80 (AJF)	Nº máximo de aplicações -5		5		
	RIOSUL (AJF)	Nº máximo de aplicações -5		1		
	ACOIDAL WG (QUIMETAL)	Nº máximo de aplicações -8	NÃO	5		
	ENXOFRE BAYER80 WG (UPL)	Em vinhas muito sensíveis usar apenas em pré-floração	SIM	-		
	STULLN AG ADVANCE (ASCENZA)					NÃO
	LAINXOFRE L (LAINCO)					
	NIREDIS (AFEPASA)	Nº máximo de aplicações -4	SIM	-		
	HELIOSOUFRE PLUS (ActioPin)	Nº máximo de aplicações -12		5		
espiroxamina (spirocetalamida) IBE	PROSPER (BAYER)	Não efetuar mais de 2 tratamentos, por cultura/ ano com este ou outro produto que contenha DMI ou espiroxamina. O período de reentrada deve ser respeitado para as culturas tratadas para tarefas que durem mais de 2 horas, 18 dias após a 1ª aplicação e 20 dias após a 2ª aplicação.	NÃO	35*/14**	Sistêmico (mobilidade ascendente)/Preventivo /curativo/Anti- Esporulante	
	RECATIUM (ARYSTABN)			35		
	SPIROSTAR (ARYSTA)			35		
	SPIROX (ARYSTA) <i>limite de utilização até 30/06/2026</i>			35*/-14**		
espiroxamina + difenoconazol (spirocetalamida + triazol) (IBE/DMI)	SPIROX D (ARYSTA)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por cultura/ ano com este ou outro produto que contenha DMI ou espiroxamina. Em uva de mesa aplicações apenas até à floração	NÃO	35*	Sistêmico /mobilidade translaminar/Preventiv o/curativo e anti-esporulante	
Flutianil (tiazolidina)	GATTEN (OAT Agrio Co., Ltd)	Realizar no máximo 2 tratamentos por ciclo cultural e alternar o uso do produto com outros de diferente modo de ação.		14	(atividade curativa), Penetrante -possui mobilidade translaminar nas folhas.	
fluxapiroxade (pirazois-carboximida) SDHI	SERCADIS 30 EC (BASF)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por campanha com este ou outro produto do mesmo grupo químico.		35	Preventivo/curativo, Sistemias ascendente Preventivo/curativo e anti-esporulante	
fluxapiroxade (pirazois-carboximida) SDHI + Mefentriflulonazol (Triazol (IBE-DMI)	REVISION PLUS	O período de reentrada de 56 dias deve ser respeitado para tarefas que durem mais de 8 horas exceto com uso de métodos mecânicos (21 dias de reentrada) Não efetuar mais de 3 tratamentos e 2 seguidos		21/56	Preventivo/curativo e anti-esporulante, Sistemias ascendente. Penetrante com mobilidade Translaminar	
fluopirame (benzamida-piridina) (SDHI)	LUNA PRIVILEGE (BAYER)	Não exceder 1 aplicação por campanha no conjunto dos produtos contendo fluopirame e fluopicolida		14*/3**	Penetrante translaminar/ Preventivo/curativo	
	LUNA ONE (BAYER)	Aplicações preventivamente dos cachos visíveis até ao bago de chumbo (BBCH 53-73) IS coberto pela época de aplicação Não exceder 2 aplicações		-/-		
fluopirame+tebuconazol (benzamida-piridina e triazol) (SDHI+IBE-DMI)	LUNA EXPERIENCE (BAYER)	Não efetuar mais de 2 tratamentos por cultura /ano, com este ou outros produtos contendo fluopirame ou fluopicolida		14*	Penetrante translaminar/ movimento Sistêmico/ preventivo/ curativo	
folpete (ftalamida)	SLEDOVAT (AUVRONE)	Não efetuar mais de 8 tratamentos, este produto trata simultaneamente, mídio e black rot (O folpete tem apenas uma eficácia parcial sobre o oídio)		28	Superfície/preventivo	
folpete+piraclostrobina (ftalimida+estrobilurina) (Qoi)	CABRIO STAR (BASF)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano e no total das doenças, com este ou outro fungicida do mesmo grupo. Combate simultaneamente o míldio . E black rot Não fazer mais de 2 tratamentos consecutivos		42*	Superfície/Penetrante c/ mobilidade translaminar/ Preventivo /Curativo	
hidrogenocarbonato de potássio (inorgânico)	ARMICARB (CERTIS/CADUBAL))	Máximo de plicações (4 a 8, dependendo do produto) A utilização do produto pode alterar a coloração dos bagos sem consequência nos processos de vinificação. Controla simultaneamente podri. cinzenta	SIM	1	Superfície/preventivo	
	VITISAN (AGRICHEM/JOVAGRO)			-		

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO OÍDIO DA VIDEIRA EM 2025(CONTINUAÇÃO III)					
Observações	MPB	Observações	MPB	I.S.	Designação comercial
Ampelomyces quisqualis🍄 estirpe AQ10" (Esporos)	AQ 10 (CBC/Fitoissistema)	Máximo 12 aplicações-antagonista específico no combate a várias espécies de oídio	SIM	1	Preventivo/contacto
Cerevisana –(paredes celulares da levedura Saccharomyces cerevisiae estirpe LAS 117)	ROMEO (ALD)	Realizar no máximo 10 aplicações, tratamentos preventivos a partir das 3 a 5 folhas, com condições favoráveis à doença		-	Superfície/preventivo /induz a ativação das defesas da planta
	EBUDIM			1	
Laminarina (molécula natu. extraída de uma alga Castanha)	VACCIPLANT (UPL /ARYSTA)	Da floração até ao fecho dos cachos devem ser mantidos os tratamentos com outras substâncias ativas		1	
	MARINA (GOEMAR)				
extrato aquoso de sementes germinadas de Lupinus albus doce	PROBLAD (CEV/LUSOSEM)	Realizar no máximo 6 tratamentos (desde os cachos visíveis até ao pintor) por ano, no conjunto das doenças. Tem ação sobre a podridão cinzenta.		-	Contacto/penetrante, ação multisítio. Preventivo/curativo
óleo de laranja	OROCIDE®(ORO AGRI)	Combate simultaneamente o míldio. Iniciar os tratamentos logo após a rebentação, ao aparecimento dos primeiros sintomas Nº máximo de aplicações -6 a 7		1	Produto de contacto com um modo de ação físico (provoca desidratação das paredes celulares dos esporos das doenças fúngicas) .Curativo/anti-esporulante
	LIMOCIDE (VIVAGRO)				
	PREV-GOLD® (ORO AGRI)				
	PREV-AM PLUS (OAEU)				
	PREV-AM ULTRA (OAEU)				
	PREV-AM® (ORO AGRI)				
SINALA (OAEU)					
cos-oga (extrato crustáceos/plantas)	FYTOSAVE (FYTOFEND)	Nº máximo de aplicações -8, aplicação preventivas antes do aparecimento da doença		3	Preventivo- Indutor das defesas naturais das plantas. Entra em competição por espaço e nutrientes com os agentes patogénicos
bacillus amyloliquefaciens🍄 estirpe FZB24	TAEGRO (NOVOZYM)	Realizar no máximo 10 aplicações por campanha		1	
bacillus pumilus estirpe QST 2808	SONATA (BAYER)	Realizar no máximo 6 aplicações por campanha		1	Preventivo- Indutor das defesas naturais das plantas. atua diretamente sobre os fungos através da produção de substâncias inibidoras da biossíntese da sua parede celular
metrafenona (benzofenona)	ATTENZO (BASF)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano alternando com fungicidas com outros modos de ação. Não efetuar mais de 2 aplicações consecutivas	NÃO	28	Penetrante com difusão sobre a forma de vapor /Preventivo/Curativo/ anti-esporulante
	VIVANDO (BASF)				
	CULTIGO (SELECTIS)				
	ELUVIA (ASCENZA)				
meptildinocape (dinitrofenol)	KARATHANE STAR (DOW/LUSOSEM/CORTEVA)	Efetuar um máximo de 4 tratamentos por ano		21	Superfície/ Preventivo/ Curativo/ anti-esporulante
	XTRACT (CORTEVA)				
	ENVICTRO (DOW)				
	DIKAR PLUS (DOW/IQV Agro PT))				
Mefentriflulonazol (Triazol (IBE-DMI)	REVYSION (BASF)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano alternando com fungicidas com outros modos de ação. Trata simultaneamente Black rot		21	Penetrante com mobilidade Translaminar e sistémica. Preventivo/Curativo
penconazol (triazol) IBE-DMI)	TOPAZE (SYNGENTA)	Tratar a partir dos cachos visíveis, apenas 3 tratamentos antes do fecho dos cachos e alternar com fungicidas com outro modo de ação		14	Penetrante com Movimento Sistémico/ / Preventivo/ Curativo
	TOPAZE 200 W (SYNGENTA)				
	DOURO 10 EC (ASCENZA)				
	VELKA (AGROTOTAL)				
	PENCOL 10 EC (SELECTIS)				
	ORISOS 200 EW (ADAMA)				
	RONTIRON (Syngenta)				
	ZOLE 100 (REFLEX)				
piraclostrobina (estrobilurina) (Qol)	CABRIO (BASF)	Não efetuar mais de 3 tratamentos, por ano e no total das doenças		35	Penetrante/Translaminar Preventivo/Curativo

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE AO OÍDIO DA VIDEIRA EM 2025(CONCLUSÃO)

Observações	MPB	Observações	MPB	I.S.	Designação comercial
tebuconazol+trifloxistrobina (triazol + estrobilurina) (IBE-DMI/Qol)	FLINT MAX (BAYER)	Apenas 2 tratamentos posicionados desde os botões florais até ao fecho dos cachos; alternar com fungicidas com outro modo de ação.	NÃO	35	Penetrante Translaminar e-com movimento sistémico /Preventivo/ Curativo /anti-esporulante
tetraconazol (triazol) (IBE-DMI)	EMINENT 125 (ISAGRO/SPICAM)	Apenas 3 tratamentos, por ano e no total das doenças, até ao fecho dos cachos		30	Penetrante com Movimento Sistémico/ / Preventivo/ Curativo
	DOMARK (ISAGRO/SPICAM)				
	TENACE (Gowan CP)				
	BAGANI (BELCHIM)				
trifloxistrobina (estrobilurina análoga) (Qol)	SAFIRA (GLOQUIMICOS)	Apenas 3 tratamentos por ano e no total das doenças, posicionados antes do fecho dos cachos, ação simultânea contra black rot		35	Absorvido pelas camadas cerosas com posterior redistribuição por ação de vapor e redeposição. Possui mobilidade lateral e translaminar essencialmente Preventivo/ anti-esporulante /com alguma ação Curativa
	FLINT (BAYER)				
	CONSIST (BAYER)				

Estação de Avisos de Entre Douro e Minho

Fonte: sifito.dgav.pt (consulta em 24/02/.2025)

Notas: [MPB](#) – modo de produção biológico; **I.S.** – Intervalo de segurança * Uvas para vinificação /** Uvas de mesa

A informação apresentada não dispensa a consulta do Rótulo/Ficha Técnica dos produtos.

Quadro 6 -Substancias ativas homologadas para o combate do <i>Pedrado das macieiras (Venturia inaequalis)</i>		
Modo de produção	Substancia ativa	Grupo químico
Modo de Produção Biológico	bacillus subtilis estirpe IAB/BS03	Microrganismo
	calda sulfo-cálcica	Óxido de cálcio+ Inorgânico
	cobre (na forma de calda bordalesa)	Inorgânico
	cobre (na forma de oxicloreto)	Inorgânico
	cobre (na forma de hidróxido)	Inorgânico
	cobre (na forma de oxicloreto) + cobre (na forma de hidróxido)	Inorgânico
	enxofre	Inorgânico
	laminarina	Molécula natural extraída de uma alga castanha
	hidrogenocarbonato de potássio (bicarbonato de potássio)	(Inorgânico)
Modo de Produção Convencional		
	captana	Ftalimidas
	ciprodinil	Anilinopirimidinas
	ciprodinil + tebuconazol	Anilinopirimidinas +(triazol) (IBE-DMI
	cresoxime-metilo	Estrobilurina) (Qol)
	difenoconazol	(triazol) (IBE-DMI
	difenoconazol + cresoxime-metilo	(triazol) (IBE-DMI)+ Estrobilurina) (Qol)
	ditianão	Quinonas
	ditianão + pirimetanil	Quinonas+ Anilinopirimidinas
	dodina	Guanidinas
	fosfonatos de potássio	Fosfanatos
	fosfonatos de potássio + ditianão	Fosfanatos+Quinona
	fosetil (na forma de sal de alumínio) + fluopirame	Organometálico + piridinil-etil-benzamida
	fluaziname	2,6- dinitroanilinas
	fluxapiraxade	Pirazóis-carboximidas) (SDHI)
	mefentrifluconazol	(Triazol (IBE-DMI)
	pirimetanil	Anilinopirimidinas
	piraclostrobina + ditianão	Estrobilurina (Qol/CAA)+ Quinona
	penthiopirade	Carboxamidas ((SDHI)
	tebuconazol	Triazol) (IBE-DMI)
	tebuconazol + fluopirame	(Triazol (IBE-DMI) +
	tetraconazol	(Triazol (IBE-DMI)
	trifloxistrobina	Estrobilurina (Qol/CAA)
	zirame	Ditiocarbamato
Consulta sifito 20/02/2025		https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usos

QUADRO 7 - FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE À PODRIDÃO CINZENTA NA CULTURA DO MIRTILLO EM 2025					
Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I.S. (dias)	Modo de ação
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> QST 713 (Microorganismo-Bactéria)	SERENADE MAX (BAYER) limite de utilização até 01/09/2025	Realizar no máximo 6 a 8 aplicações (ver rótulo) Ação antagonista que previne e evita a fixação e penetração do agente patogénico. Paralelamente, poderá induzir na planta uma resistência sistémica ao patogéneo	SIM	1	Preventivo
	SERENADE ASO (BAYER)				
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> estirpe AH2 (Microorganismo-Bactéria)	Botrybel (PROBELTE)*	Realizar no máximo 4 aplicações com este produto, por ciclo cultural. Apenas para cultura protegida*		1	Preventivo
<i>Bacillus subtilis</i> estirpe IAB/BS03(Microorganismo-Bactéria)	FUNGISEI (SEIPASA)	Não efectuar mais do que 5 tratamentos por campanha com este produto, com intervalos de 5 a 7 dias. Atua por competição por espaço e nutrientes com os agentes patogénicos. Induz também os mecanismos de defesa da planta.		1	Preventivo
<i>Aureobasidium pullulans</i> DSM 14940 + <i>Aureobasidium pullulans</i> DSM 14941 (microorganismo-Fungo)	BOTECTOR (BIOFERM)	Realizar no máximo 6 (BOECTOR) a 8 (JULIETA) e HIVA)) tratamentos anuais com estes produtos. Iniciar as aplicações no início da floração enquanto as condições meteorológicas decorrerem favoráveis à doença. Estes microrganismos entram em competição, por espaço e nutrientes, com o fungo da podridão cinzenta .		1	Preventivo
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> estirpe LAS02 (microrganismo-levedura)	JULIETTA (AGRAUXINE)			1	Preventivo
	HIVA (AGX)			1	Preventivo
extrato aquoso de sementes germinadas de tremço doce (Lupinus albus)	PROBLAD (CEV)	Tratar preventivamente desde o aparecimento da inflorescência até à colheita dos frutos BBCH 55-94. Máximo 6 tratamentos		1	Preventivo
eugenol+geraniol+timol (extratos de plantas –terpenos)	ARAW (SIPCAM P / EDEN)	Aplicar desde a formação dos frutos até à colheita (BBCH 71-89). Máximo uma aplicação		1	Preventivo/curativo
<i>cerevisana</i> Paredes celulares da levedura <i>Saccharomyces cerevisiae</i> estirpe LAS 117	ROMEO (AGX)	Não possui ação direta sobre os patogéneos, atua preventivamente como indutor das defesas naturais das plantas Máximo de 7 a 8 aplicações (dependendo da s.ativa)	NÃO	1	Preventivo
	EBUIM (AGX)				
<i>Laminarina</i> Molécula natural extraída de uma alga castanha	VACCIPLANT (GOEMAR)			1	Preventivo
	MARINA (GOEMAR)				
<i>fenehesxmida</i> (hidroxianilida) IBE	TELDOR (BAYER)	Homologado apenas em cultura protegida* , tratar ao aparecimento dos sintomas da doença, desde os primeiros botões florais visíveis até aos frutos atingirem o tamanho final (BBCH 55 a 89). Máximo 3 aplicações.		3	Penetrante c/mobilidade translaminar/preventivo/curativo/ e anti esporulante
	TELDOR SC (BAYER)				
	SONAR (BAYER)				

FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE À PODRIDÃO CINZENTA NA CULTURA DO MIRTILO EM 2025					
Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB	I.S. (dias)	Modo de ação
fenepirazamina (amino-pyrazolinone) IBE	PROLECTUS (SUMITOMO)	Aplicar antes da plena floração (BBCH 65), enquanto as condições forem favoráveis ao desenvolvimento da doença.Máximo 3 aplicações		Coberto pela época de aplicação	Penetrante c/mobilidade translaminar/prev entivo/curativo/ e anti esporulante
ciprodinil+fludioxonil (anilinopirimidina + cianopirrole)	SWITCH 62,5 WG (Syngenta)	Aplicar desde a floração até próximo da colheita- Máximo 3 aplicações por ano com este e outros fungicidas contendo fenilpirrol e anilinopirimidinas		7	Sistêmico/ Superfície/Preven tivo/Curativo
	BOTREFIN (FINCHIM) c	Homologado apenas em cultura ao ar livre			
pirimetanil (anilinopirimidina)	PYRUS (ARYSTABN)	Máximo 2 tratamentos em cultura de ar livre. Tratamentos a partir da floração com condições favoráveis à doença		21	Penetrante/ Translaminar e com ação de vapor/Preventivo/ Curativo
	SCALA (BASF)**			14	
	ERUNE 40 SC ** (ASCENZA)	Máximo 1 tratamento (Apenas tratamentos em cultura de ar livre) com este produto ou outro contendo anilinopirimidinas		7	
trifloxistrobina + fluopirame (estrobilurina + benzamida- piridina)(Qol/SDHI)	LUNA SENSATION (BAYER) c	Cultura de ar livre-1 aplicação) Cultura protegida-2 aplicações		7	Penetrante c/mobilidade Translaminar/prev ent./curativo/anti- esporulante
boscalide + piraclostrobina (carboximida+estrobilurina) (SDHI/Qol)	SIGNUM (BASF)**	Apenas em cultura de ar livre** Máximo de 1,5 kg de produto comercial por hectare. Máximo dois tratamentos, por ciclo vegetativo, com este ou outro produto com o mesmo modo de ação (SDHI) e/ou (Qol).		3	Sistêmico/Penetr ante c/mobilidade Translaminar/prev entivo e curativo
IS- Intervalo de segurança/ MPB - Modo de Produção Biológico *cultura protegida, ** cultura de ar livre A informação apresentada não dispensa a consulta do Rótulo/Ficha Técnica dos produtos.					

Fonte: sifito.dgav.pt -consulta em 19/02/2025

QUADRO 5 - FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE À BACTERIOSE DA NOGUEIRA EM 2025						
Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB.	I. S.	Modo de ação	
Laminarina (molécula natural extraída de uma alga castanha)	VACCIPLANT (UPL /ARYSTA)	Máximo de 7 aplicações por ano para o conjunto dos inimigos. Tratar preventivamente desde a fase do botão verde até ao final da floração.	SIM	1	Superfície/preventivo /induz a ativação das defesas naturais das plantas	
	MARINA (GOEMAR)					
Bacillus amyloliquefaciens QST 713	SERENAD ASO (BAYER)	Não fazer mais de 6 aplicações em cada ano.Tratar preventivamente após a floração e até que os frutos atinjam 50% do seu tamanho final		3	Superfície/ Preventivo	
cobre (oxicloreto de cobre) (inorgânico)	CUPROXI FLO (ADAMA)	Em pré-floração. Máximo 4 aplicações		* / -		
	ZZ- CUPROCOL (SYNGENTA)	Máximo 3 aplicações		* / -		
cobre (hidróxido de cobre) (inorgânico)	KADOS (DUPONT)	Tratar ao abrolhamento dos gomos, durante e no final da floração e à queda das folhas. Se o tempo decorrer húmido, tratar ainda em Julho e em pleno Verão.		7		
	KOCIDE 2000 (DUPONT)					
	KOCIDE 35 DF (DUPONT)					
	KOCIDE OPTI (DUPONT)					
	CHAMPION WG (NUFARM)	Não se recomenda para locais com ocorrências de geadas fortes				
	CHAMPION WP (NUFARM)					
	HIDROTEC 50% WP (SELECTIS)		Máximo 6 aplicações			
	VITRA 40 MICRO (IND. VALLÉS)	Tratar ao abrolhamento dos gomos, no final da floração e à queda das folhas. Se o tempo decorrer húmido e /ou chuvosos, tratar ainda em Julho e em pleno Verão.				
	COPERNICO 25% HI BIO (AMBECHEM)					
	HIDROTEC 20% HI BIO (AMBECHEM)					
cobre (sulfato de cobre tribásico) (inorgânico)	CUPROXAT (NUFARM_P)	Máximo 2 tratamentos	14			
	NOVIVURE (UPL)	Não aplicar após o final da floração. Máximo 3 aplicações. Não aplicar após o final da floração.				
cobre (hidróxido de cobre+ oxicloreto de cobre) (inorgânico)	CUPRONTOL DUO (ADAMA)	Realizar uma aplicação entre o abrolhamento e o fim da floração, não excedendo a dose de 4 kg/Cu/ha/ano, no conjunto dos produtos que contenham cobre.	14			
	GRIFON (ISAGRO)					
fosfonatos de potássio (fosfanato)	CENTURY (BASF)	Máximo 6 aplicações, em pleno desenvolvimento vegetativo, com este ou outros produtos do grupo dos fosfanatos e fosetil	NÃO	21	Sistémico/ preventivo/Estimula a defesa natural das plantas	

QUADRO 8 - FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE À BACTERIOSE (PSA) DO KIWI EM 2025					
Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB.	I. S.	Modo de ação
Laminarina (molécula natural extraída de uma alga castanha)	VACCIPLANT (UPL /ARYSTA)	Máximo de 7 aplicações por ano para o conjunto dos inimigos. Realizar os tratamentos de modo preventivo, desde as primeiras folhas visíveis até o final da maturação dos frutos BBCH10-89 (apenas Actinidia deliciosa)	SIM	1	Superfície/preventivo /induz a ativação das defesas naturais das plantas
	MARINA (GOEMAR)				
Bacillus amyloliquefaciens QST 713 (microrganismo)	SERENAD ASO (BAYER)	Não fazer mais de 6 aplicações em cada ano.		3	Superfície/ Preventivo
Bacillus amyloliquefaciens MBI 600 (microrganismo)	SERIFEL (BASF)	Iniciar os tratamentos preventivamente a partir da fase de pré-floração até à fase da colheita (BBCH 51 - BBCH 71-79).		1	
Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum estirpe D-747 (microrganismo)	AMYLO-X WG (MITSUI)	Desde a emergência da primeira folha até quase a totalidade dos frutos atingir maturação (BBCH10 a BBCH89).		3	
cobre (oxicloreto de cobre) (inorgânico)	CUPRAVIT	1 tratamento no fim da colheita, 1 a 2 tratamentos durante a queda das folhas (50% e 100%), 1 tratamento após a poda de inverno e 1 tratamento à rebentação. Máximo 5 aplicações		* / -	
		Máximo 3 aplicações Aplicar à queda das folhas (início, meio e fim) - BBCH 93-97 (Actinidia chinensis)		* / -	
	CUPRITAL SC (ASCENZA)	Efetuar 1 tratamento ao fim da colheita ou durante a queda das folhas (25 a 50% de queda) (BBCH 91-97) ; ou após a poda de Inverno ou rebentação (até BBCH 31)		* / -	
	CUPRITAL	Efetuar 1 tratamento ao fim da colheita; 1-2 tratamentos, durante a queda das folhas (25 a 50% de queda); 1 tratamento, após a poda de Inverno e 1 tratamento, na rebentação. Máximo 4/5 tratamentos. (Actinidia deliciosa)		* / -	

QUADRO - FUNGICIDAS HOMOLOGADOS PARA O COMBATE À BACTERIOSE (PSA) DO KIWI EM 2025					
Substância ativa	Designação comercial	Observações	MPB.	I. S.	Modo de ação
cobre (hidróxido de cobre) (inorgânico)	VITRA 40 MICRO (IND. VALLÉS)	Tratamentos à rebentação/ abrolhamento, antes do aparecimento da ponta verde (BBCH00 a BBCH08)Máximo 2aplicações Não se recomenda em áreas e locais onde as condições sejam favoráveis a geadas fortes.		- / -	Superfície/ Preventivo
cobre (sulfato de cobre tribásico) (inorgânico)	CUPROXAT (NUFARM_P)	Efetuar um tratamento ao fim da colheita, ou durante a queda das folhas (25% a 50% de queda); e ou após a poda de Inverno e/ou na rebentação. (BBCH 91-03) Realizar no máximo 2 tratamentos Actinidia chinensis		* / -	
	NOVIVURE (UPL)	Tratar (máximo 3 trat), quando as condições climáticas forem favoráveis ao desenvolvimento da doença, desde após a colheita dos frutos até ao final do entumescimento dos gomos.. (Actinidia deliciosa)		21	
cobre (na forma de óxido cuproso)	COBRE NORDOX 75 WG	3 tratamentos durante o período vegetativo, a partir do abrolhamento a cada 30 dias com interrupção na floração e o último tratamento, até 20 dias antes da colheita		20 / -	
cobre (hidróxido de cobre+ oxicloreto de cobre) (inorgânico)	CUPRONTOL DUO (ADAMA)	Realizar dois tratamentos durante o desenvolvimento vegetativo da cultura, com 15 dias de intervalo. Ou realizar um tratamento durante o repouso vegetativo (Actinidia deliciosa)		20 / -	
	GRIFON (ISAGRO)				
Cobre (calda bordalesa) (inorgânico)	CALDA BORDALESA VALLÉS	Tratar durante a queda das folhas, após a poda de inverno e à rebentação (BBCH97, BBCH00 e BBCH07).Máximo 3 tratamentos)		- / -	